

## การเฝ้าระวังยาเสพติด

“ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังยาเสพติดได้”

1. ตนเอง  
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2. ครอบครัว  
รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ดูแล  
ลูกหลานอย่างใกล้ชิด

3. สถานศึกษา

ให้ความรู้และดูแลช่วยเหลือด้วย  
ความรักแก่เด็กและเยาวชน

4. สถานประกอบการ

สอดส่องดูแล และให้โอกาสผู้  
ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับตัวใหม่

## 10 วิธี

### หลีกหนียาเสพติด

1. เตรียมใจให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
2. เมื่อมีปัญหาทบทวนสาเหตุเพื่อหาแนว  
ทางแก้ไข
3. ปรับปรุงสถานที่ทำงานและที่บ้านเพื่อสร้าง  
บรรยากาศที่ดี
4. ออกกำลังกายอย่างน้อย ๓-๕ วัน/สัปดาห์
5. นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย ๗-๘ ชั่วโมง/วัน
6. ทำงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำ
7. งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การพนัน ไม่สำส่อนทางเพศ
8. ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต ไม่ห้อโอย
9. สร้างกำลังใจให้ตนเอง
10. คิดบวก มองโลกในแง่ดี



# ความรู้ เกี่ยวกับ ยาเสพติด



ด้วยความปรารถนาดีจาก  
องค์กรบริการส่วนตำบลเข้มแรร  
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

[www.chamrae.go.th](http://www.chamrae.go.th)

โทร 032-297557

# ยาเสพติด

## ภัยพิบัตร้าย

### กำลังยึดเวท

#### ยาเสพติด คือ

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย

#### ยาเสพติดให้โทษ

“ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมี พิช หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพแล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ มีอาการถอนยา เมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไป จะทรุดโทรมลง กับให้รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึง ยาสามัญประจำบ้านบางตัวรับที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยยา

#### วัตถุออกฤทธิ์

“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและร่างกายที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือ ที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและร่างกายที่เป็นวัตถุสังเคราะห์

#### สารระเหย

“สารระเหย” หมายความว่า สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้เพื่อสนองความต้องการของร่างกายหรือจิตใจซึ่งทำให้สุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง

#### ประเภทของยาเสพติด

ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เอโรอิน

ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคลาอีน โคเดอีน ฟันยา



ประเภทที่ 3 ยาเสพติดประเภทนี้เป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภทที่ 2 ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทางการแพทย์ การนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น หรือเพื่อเสพติด จะมีบทางโทษกำกับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ ยาแก้ไอ ที่มีตัวยาโคโคเอิน ยาแก้ท้องเสีย ที่มีผิ่นผสมอยู่ด้วยยาฉีดระงับปวดต่างๆ เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจากการผิ่น

ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติก แอนไฮไดรค์ อาเซติลคลอไรด์

ประเภทที่ 5 ได้แก่ พิชผิ่น เห็ดเข็คaway หรือพิชเห็ดเข็คaway สารสกัดทุกส่วนของพิชกัญชาหรือกัญชง ยกเว้น

- สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพิชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูก ภายใต้กฎหมายในประเทศไทย

- สารสกัดจากเมล็ดของพิชกัญชาหรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศไทย

